

BIENVENUE AU TRAITEMENT DE L'ASTHME PAR SYMBICORT® TURBUHALER®



Bonjour.

Poursuivez la lecture pour obtenir des renseignements sur l'asthme et sur le traitement par SYMBICORT TURBUHALER que vous a prescrit votre médecin. Prenez toujours SYMBICORT TURBUHALER en suivant à la lettre les instructions que l'on vous a données.

Les voies respiratoires des personnes asthmatiques présentent de l'**inflammation**. L'inflammation peut s'aggraver et provoquer l'apparition de symptômes de l'asthme lorsque les voies respiratoires commencent à rétrécir. La respiration devient alors laborieuse.

**VOIES
RESPIRATOIRES
NORMALES**
Aucune
inflammation



**VOIES
RESPIRATOIRES
ENFLAMMÉES**
• Resserrement
musculaire
• Inflammation



SYMBICORT TURBUHALER CONTIENT UN MÉLANGE DE DEUX SUBSTANCES

FORMOTÉROL

Traite les symptômes.

- Peut aider à dilater ou à ouvrir les voies respiratoires
- Peut aider à faciliter la respiration



BUDÉSONIDE

Traite l'inflammation.

- Peut aider à garder les voies respiratoires ouvertes
- Réduit et prévient l'inflammation causée par l'asthme

Renseignements sur l'innocuité

SYMBICORT TURBUHALER est utilisé pour traiter l'asthme chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus. Si vous êtes âgé de 12 à 18 ans, votre croissance devrait être surveillée régulièrement par un médecin.

Les effets secondaires signalés le plus souvent avec SYMBICORT TURBUHALER sont les maux de tête, les tremblements, la sensation de cœur qui bat, la toux, l'irritation de la bouche et/ou de la gorge et l'enrouement. Si l'un ou l'autre de ces effets secondaires vous préoccupe, n'arrêtez pas le traitement, mais parlez-en à votre médecin.

Les médicaments suivants peuvent interagir avec SYMBICORT TURBUHALER : bêta-bloquants (propranolol, aténolol, timolol), kétoconazole, itraconazole, ritonavir, diurétiques (qui favorisent l'élimination de l'eau), antidépresseurs et inhibiteurs de la monoamine oxydase.

Si vous avez pris des corticostéroïdes par voie orale pour traiter votre asthme et que vous éprouvez soudainement une crise d'asthme grave en commençant à prendre SYMBICORT TURBUHALER, consultez immédiatement votre médecin.

Lorsque les BALA sont utilisés seuls sans un corticostéroïde par inhalation (CSI), ils augmentent le risque d'hospitalisations et de décès liés à l'asthme. SYMBICORT TURBUHALER contient à la fois un CSI et un β_2 agoniste à longue durée d'action (BALA). Les études révèlent que lorsqu'on utilise un CSI et un BALA ensemble, il n'y a pas de risque accru significatif d'hospitalisations et de décès liés à l'asthme.

Si vous remarquez les signes avant-coureurs suivants, consultez sans tarder votre médecin ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche : absence de soulagement après la prise de votre médicament de secours; aggravation soudaine de l'essoufflement ou de la respiration sifflante après l'administration du médicament de secours; mesure du débitmètre de pointe inférieure à 60 % de la valeur prédite ou de votre maximum personnel; essoufflement au repos; accélération du pouls (plus de 120 battements à la minute).

Pour de plus amples renseignements, consultez le dépliant de renseignements pour les consommateurs fourni avec votre inhalateur SYMBICORT TURBUHALER.

SYMBICORT®, TURBUHALER® et le logo d'AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc. © 2024 AstraZeneca Canada Inc. 1004 Middlegate Road, bureau 5000, Mississauga (Ontario) L4Y 1M4



Visionnez la vidéo éducative sur SYMBICORT TURBUHALER sur le site SYMBICORT.ca.

AstraZeneca



CA-1219F

Symbicort®
budésonide/fumarate
de formotérol dihydrate

SYMBICORT TURBUHALER

1 : ASTHME LÉGER PERSISTANT

TRAITEMENT DE **SECOURS** ANTI-INFLAMMATOIRE
PAR SYMBICORT 200 TURBUHALER

ou

2 : ASTHME MODÉRÉ OU GRAVE

TRAITEMENT DE **SECOURS** ANTI-INFLAMMATOIRE ET
TRAITEMENT D'ENTRETIEN PAR SYMBICORT _____ TURBUHALER

1

INHALATION EN RÉPONSE
AUX SYMPTÔMES

+ 1

INHALATION APRÈS QUELQUES
MINUTES, SI LES SYMPTÔMES
PERSISTENT

Il ne faut pas prendre plus de 6 inhalations à la fois. Dans tous les cas, il ne faut pas prendre plus de 8 inhalations par jour.

INHALATION(S)
LE MATININHALATION(S)
LE SOIR

1

INHALATION EN RÉPONSE
AUX SYMPTÔMES

+ 1

INHALATION APRÈS
QUELQUES MINUTES, SI LES
SYMPTÔMES PERSISTENT

Il ne faut pas prendre plus de 6 inhalations à la fois. Dans tous les cas, il ne faut pas prendre plus de 8 inhalations par jour.

Votre médecin ne vous prescrira qu'UNE SEULE des deux approches décrites à gauche. Suivez ces directives et ayez toujours SYMBICORT TURBUHALER à portée de la main pour le soulagement rapide des symptômes.

PASSER À L'ACTION. Consultez votre professionnel de la santé dans les cas suivants :



Vous n'obtenez pas un soulagement aussi efficace ou aussi durable qu'à l'habitude.

Vous n'êtes plus soulagé « comme à l'habitude » si vous notez une intensification de :

- la respiration sifflante
- la toux
- l'oppression thoracique ou de l'essoufflement



Vous prenez plus de 8 inhalations par jour.



Vous augmentez constamment l'usage de votre traitement de secours sans obtenir une meilleure maîtrise de l'asthme en 2 semaines.



Vos symptômes vous réveillent la nuit.



La valeur indiquée sur votre débitmètre de pointe représente de 60 à 80 % de votre meilleur résultat personnel.

Il pourrait s'agir de signes que votre asthme **S'AGGRAVE**. Consultez votre professionnel de la santé pour évaluer votre dose et la maîtrise de votre asthme.

OBTENEZ IMMÉDIATEMENT DE L'AIDE MÉDICALE si vous remarquez les signes avant-coureurs suivants :



Après avoir pris votre traitement de secours avec SYMBICORT TURBUHALER :

- vous ne ressentez aucun soulagement, ou
- vos symptômes d'essoufflement ou de respiration sifflante s'aggravent.



Votre pouls est très rapide (plus de 120 battements par minute).



La valeur indiquée sur votre débitmètre de pointe représente moins de 60 % de votre meilleur résultat personnel.

Parlez-en à un professionnel de la santé **SANS TARDER** ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche.



Vous êtes essoufflé au repos.