

VOICI SYMBICORT®

Indication

Symbicort® Turbuhaler® est indiqué :

- dans le traitement de l'asthme chez les patients de 12 ans et plus qui présentent une maladie obstructive réversible des voies respiratoires¹.

Symbicort® 200 Turbuhaler® est indiqué :

- dans le traitement d'entretien de la MPOC modérée à grave, y compris de la bronchite chronique et de l'emphysème, chez les patients qui présentent des symptômes persistants et des antécédents d'exacerbations, lorsqu'un traitement d'association est approprié¹.



Symbicort®

budesonide/fumarsate
de formotérol dilués

ASTHME

SYMBICORT® 200 TURBUHALER® PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME TRAITEMENT DE SECOURS ANTI-INFLAMMATOIRE CONTRE L'ASTHME LÉGER PERSISTANT¹

Prendre 1 inhalation de Symbicort® 200 Turbuhaler® au besoin en réponse aux symptômes. Si les symptômes persistent, il faut prendre une autre inhalation¹.

Il faut aviser les patients de toujours garder Symbicort® Turbuhaler® à portée de la main pour le soulagement rapide des symptômes. La dose quotidienne maximale de Symbicort® est de 8 inhalations. Ne pas prendre plus de 6 inhalations à la fois. L'augmentation persistante de l'usage de Symbicort® Turbuhaler® au besoin indique une détérioration de la maîtrise de l'asthme et l'état du patient doit alors être réévalué pour pouvoir déterminer le traitement approprié. Veuillez consulter la monographie de Symbicort® Turbuhaler® pour obtenir tous les renseignements sur la posologie et l'administration¹.


* Symbicort® 100 Turbuhaler® ne doit pas être utilisé comme traitement de secours anti-inflammatoire avec Symbicort®¹.



ASTHME

SYMBICORT® TURBUHALER® PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME TRAITEMENT DE SECOURS ANTI-INFLAMMATOIRE ET D'ENTRETIEN CONTRE L'ASTHME MODÉRÉ ET GRAVE¹

Une fois la maîtrise de l'asthme atteinte, la dose doit être ajustée à la plus faible dose à laquelle la maîtrise des symptômes est efficacement maintenue. Il faut aviser les patients de toujours garder Symbicort® Turbuhaler® à portée de la main pour le soulagement rapide des symptômes. La dose quotidienne maximale de Symbicort® est de 8 inhalations. Ne pas prendre plus de 6 inhalations à la fois. L'augmentation persistante de l'usage de Symbicort® Turbuhaler® au besoin indique une détérioration de la maîtrise de l'asthme et l'état du patient doit alors être réévalué pour pouvoir déterminer le traitement approprié. Veuillez consulter la monographie de Symbicort® Turbuhaler® pour obtenir tous les renseignements sur la posologie et l'administration¹.




MPOC

SYMBICORT® 200 TURBUHALER®

PEUT ÊTRE UTILISÉ

COMME TRAITEMENT D'ENTRETIEN DE LA MALADIE PULMONAIRE
OBSTRUCTIVE CHRONIQUE (MPOC) MODÉRÉE À GRAVE¹



La dose quotidienne maximale de Symbicort® 200 Turbuhaler® est de 4 inhalations.

Symbicort® 200 Turbuhaler ne doit pas être utilisé pour traiter les symptômes aigus de la MPOC¹.

Pour des bienfaits optimaux, il faut recommander aux patients de prendre leur dose d'entretien quotidienne même en l'absence de symptômes.

Usage clinique :

ASTHME

Symbicort® Turbuhaler® peut être utilisé selon trois stratégies différentes de traitement :

A. Traitement de secours anti-inflammatoire avec Symbicort® Turbuhaler® :

chez les patients atteints d'asthme léger persistant, Symbicort® 200 Turbuhaler® est pris au besoin pour le soulagement des symptômes d'asthme lorsqu'ils surviennent. Symbicort® 200 Turbuhaler® n'a pas été évalué chez les patients dont l'asthme peut être maîtrisé par l'emploi occasionnel d'un bêta₂-agoniste par inhalation à courte durée d'action qui agit rapidement.

B. Traitement de secours anti-inflammatoire et d'entretien avec Symbicort® Turbuhaler® :

chez les patients atteints d'asthme modéré ou grave, Symbicort® 100 Turbuhaler® ou Symbicort® 200 Turbuhaler® sont pris à la fois comme traitement d'entretien quotidien et au besoin pour le soulagement des symptômes d'asthme lorsqu'ils surviennent.

C. Traitement d'entretien avec Symbicort® Turbuhaler® :

chez les patients atteints d'asthme modéré ou grave, Symbicort® Turbuhaler® est pris comme traitement quotidien à dose fixe avec un bronchodilatateur distinct à courte durée d'action pour le soulagement des symptômes d'asthme lorsqu'ils surviennent.

Une fois la maîtrise de l'asthme atteinte et maintenue, le patient doit être évalué à intervalles réguliers.

MPOC

Symbicort® Turbuhaler® n'est pas indiqué pour le soulagement du bronchospasme aigu chez les patients atteints de MPOC

Contre-indications :

- Hypersensibilité au lactose inhalé

Mises en garde et précautions les plus importantes :

Risque de manifestations graves liées à l'asthme — hospitalisations, intubations et décès : L'utilisation de bêta₂-agonistes à longue durée d'action (BALA) en monothérapie (sans corticostéroïdes par inhalation [CSI]) peut faire hausser les risques d'hospitalisations et de

décès liés à l'asthme chez les enfants et les adolescents. Ces résultats sont considérés comme un effet de classe des BALA utilisés en monothérapie. Lorsque les BALA sont utilisés dans une association à dose fixe avec un CSI, les données de vastes essais cliniques ne montrent pas d'augmentation importante du risque de manifestations graves liées à l'asthme (hospitalisations, intubations, décès) comparativement au CSI seul.

Antiasthmatique de secours : Informer les patients de toujours garder un médicament de secours à portée de la main. Les patients asthmatiques doivent recevoir des instructions claires sur l'usage du médicament pour le soulagement des symptômes d'asthme (comme Symbicort® Turbuhaler® ou le salbutamol).

Usage excessif et usage avec d'autres BALA :

Il ne faut pas dépasser la posologie recommandée de Symbicort® Turbuhaler®. Des effets cardiovasculaires et des décès ont été rapportés en association avec un usage excessif de sympathomimétiques par inhalation.

Emploi chez l'adolescent : Envisager des réévaluations périodiques étant donné que la gravité de l'asthme peut varier avec l'âge. Les effets généraux qui peuvent se produire (comme c'est le cas pour tout corticostéroïde par inhalation) comprennent un retard de croissance chez les enfants et les adolescents. Les médecins doivent surveiller de près la croissance des adolescents qui prennent des corticostéroïdes à long terme et soupeser les bienfaits de la maîtrise de l'asthme en regard de la possibilité d'une inhibition de la croissance.

Effets généraux des corticostéroïdes : Tout corticostéroïde par inhalation peut entraîner des effets généraux, parmi lesquels notons le syndrome de Cushing, les traits cushingoides et l'inhibition de la fonction surrénalienne, la diminution de la densité minérale osseuse, la cataracte et le glaucome. La dose de tout corticostéroïde par inhalation doit être ajustée à la plus faible dose à laquelle la maîtrise est effectivement maintenue. Les effets généraux qui peuvent se produire (comme c'est le cas pour tout corticostéroïde par inhalation) comprennent un retard de croissance chez les enfants et les adolescents.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :

- Un traitement d'entretien ayant recours à une corticothérapie par inhalation doit être abandonné non pas soudainement, mais graduellement sous supervision.
- Effets cardiovasculaires
- Candidose
- Hyperglycémie, hypokaliémie
- Effet accentué des corticostéroïdes chez les patients souffrant d'hypothyroïdie et de cirrhose
- Insuffisance surrénalienne chez les patients auparavant traités par un corticostéroïde à action générale
- Diminution de la densité minérale osseuse
- Dans de rares cas, affections générales à éosinophiles
- Vulnérabilité ou affaiblissement de la résistance aux infections
- Glaucome, augmentation de la pression intraoculaire et cataractes
- Risque accru de pneumonie et risque d'infection pulmonaire chez les patients atteints de MPOC
- Bronchospasme paradoxal
- Risque durant la grossesse, le travail, l'accouchement ou l'allaitement
- N'est pas recommandé chez les patients atteints de MPOC de moins de 18 ans
- Précautions particulières chez les patients de plus de 65 ans qui souffrent d'une maladie cardiovasculaire concomitante
- La maîtrise de l'asthme ou de la MPOC doit être surveillée
- La fonction de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et le bilan hématologique doivent être vérifiés périodiquement

Pour de plus amples renseignements :

Veillez consulter la monographie du produit à symbicort-fr.astrazeneca.ca pour obtenir des renseignements importants concernant les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie. Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en appelant AstraZeneca Canada au 1-800-461-3787.

Référence : 1. Monographie de Symbicort® Turbuhaler®. AstraZeneca Canada Inc. 8 février 2021.



SYMBICORT®, TURBUHALER® et le logo d'AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc. © AstraZeneca Canada Inc. 2024



CA-5253F

