

Usage clinique :

SYMBICORT TURBUHALER peut être utilisé selon trois stratégies différentes de traitement :

A. Traitement de secours anti-inflammatoire avec SYMBICORT TURBUHALER : chez les patients atteints d'asthme léger persistant, SYMBICORT 200 TURBUHALER est pris au besoin pour le soulagement des symptômes de l'asthme lorsqu'ils surviennent. SYMBICORT TURBUHALER n'a pas été évalué chez les patients dont l'asthme peut être maîtrisé par l'emploi occasionnel d'un bêta₂-agoniste par inhalation à courte durée d'action qui agit rapidement.

B. Traitement de secours anti-inflammatoire et d'entretien avec SYMBICORT TURBUHALER : chez les patients atteints d'asthme modéré ou grave, SYMBICORT 100 TURBUHALER ou SYMBICORT 200 TURBUHALER sont pris à la fois comme traitement d'entretien quotidien et au besoin pour le soulagement des symptômes d'asthme lorsqu'ils surviennent.

C. Traitement d'entretien avec SYMBICORT TURBUHALER : chez les patients atteints d'asthme modéré ou grave, SYMBICORT TURBUHALER est pris comme traitement quotidien à dose fixe avec un bronchodilatateur distinct à courte durée d'action pour le soulagement des symptômes d'asthme lorsqu'ils surviennent.

Une fois la maîtrise de l'asthme atteinte et maintenue, le patient doit être évalué à intervalles réguliers.

Contre-indications :

- Hypersensibilité au lactose inhalé

Mises en garde et précautions importantes :

Risque de manifestations graves liées à l'asthme – hospitalisations, intubations, décès : L'utilisation de bêta₂-agonistes à longue durée d'action (BALA) en monothérapie (sans corticostéroïdes par inhalation [CSI]) augmentera les risques d'hospitalisations et de décès liés à l'asthme chez les enfants et les adolescents. Ces résultats sont considérés comme un effet de classe des BALA utilisés en monothérapie. Lorsque les BALA sont utilisés dans une association à dose fixe avec un CSI, les données de vastes essais cliniques ne montrent pas d'augmentation importante du risque de manifestations graves liées à l'asthme (hospitalisations, intubations, décès) comparativement au CSI seul.

Antiasthmatique de secours : Informer les patients asthmatiques de toujours garder un médicament de secours à portée de la main. Les patients asthmatiques doivent recevoir des instructions claires sur l'usage du médicament pour le soulagement des symptômes (comme SYMBICORT TURBUHALER, la terbutaline ou le salbutamol).

Usage excessif et usage avec d'autres BALA :

Il ne faut pas dépasser la posologie prescrite de SYMBICORT TURBUHALER. Des effets cardiovasculaires cliniquement significatifs et des décès ont été rapportés en association avec un usage excessif de sympathomimétiques par inhalation.

Emploi chez l'adolescent : Envisager des réévaluations périodiques étant donné que la gravité de l'asthme

peut varier avec l'âge. Les effets généraux possibles pouvant survenir avec n'importe quel corticostéroïde par inhalation comprennent notamment un retard de croissance chez les enfants et les adolescents. Les médecins doivent surveiller de près la croissance des adolescents qui prennent des corticostéroïdes à long terme et soupeser les bienfaits de la maîtrise de l'asthme en regard de la possibilité d'une inhibition de la croissance.

Effets généraux des corticostéroïdes : Tout corticostéroïde par inhalation peut entraîner des effets généraux, dont le syndrome de Cushing, les traits cushingoides et l'inhibition de la fonction surrénalienne, la diminution de la densité minérale osseuse, la cataracte et le glaucome. La dose de tout corticostéroïde par inhalation doit être ajustée à la plus faible dose à laquelle la maîtrise est effectivement maintenue.

Arrêt du traitement : Un traitement d'entretien ayant recours à une corticothérapie par inhalation doit être abandonné non pas soudainement, mais graduellement sous supervision.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :

- Effets cardiovasculaires
- Candidose
- Hyperglycémie et hypokaliémie
- Effet accentué des corticostéroïdes chez les patients souffrant d'hypothyroïdie et de cirrhose
- Insuffisance surrénalienne chez les patients asthmatiques auparavant traités par un corticostéroïde à action générale
- Diminution de la densité minérale osseuse
- Dans de rares cas, affections générales à éosinophiles
- Vulnérabilité ou affaiblissement de la résistance aux infections
- Glaucome, augmentation de la pression intra-oculaire et cataracte
- Bronchospasme paradoxal
- Risque durant la grossesse, le travail, l'accouchement ou l'allaitement
- Précautions particulières chez les patients de plus de 65 ans qui souffrent d'une maladie cardiovasculaire concomitante
- La maîtrise de l'asthme doit être surveillée
- La fonction de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et le bilan hématologique doivent être vérifiés périodiquement
- N'est pas recommandé chez les patients asthmatiques de moins de 12 ans

Pour de plus amples renseignements :

Veuillez consulter la monographie du produit à symbicort-fr.azpm.ca pour obtenir des renseignements importants concernant les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie. Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en appelant AstraZeneca Canada au 1-800-461-3787.



Commencer le traitement de secours anti-inflammatoire avec SYMBICORT® TURBUHALER®

Bloc de feuillets détachables pour conseiller les patients

SYMBICORT TURBUHALER est indiqué dans le traitement de l'asthme chez les patients de 12 ans et plus qui présentent une maladie obstructive réversible des voies respiratoires.

Symbicort
budesonide/fumarate
de formotérol dihydrate

Symbicort
budesonide/fumarate
de formotérol dihydrate

PROFIL PHARMACODYNAMIQUE

SYMBICORT TURBUHALER a démontré un début d'action rapide^{1,*}

- Il a été démontré que SYMBICORT TURBUHALER et le salbutamol, un bronchodilatateur à courte durée d'action, agissent à des vitesses comparables.

MODE D'ACTION

SYMBICORT TURBUHALER contient 2 molécules actives (budésonide et formotérol) dans 1 inhalateur^{1,*}

- Le budésonide et le fumarate de formotérol dihydraté possèdent des modes d'action différents et ont pour effet de réduire de façon additive les exacerbations de l'asthme.
- SYMBICORT TURBUHALER peut être administré comme traitement de secours anti-inflammatoire et d'entretien grâce à l'effet bronchodilatateur rapide du formotérol et aux effets anti-inflammatoires du budésonide.

Renseignements importants sur l'innocuité : Les patients ne doivent pas prendre plus de 6 inhalations à la fois et pas plus de 8 inhalations par jour lorsqu'ils utilisent SYMBICORT TURBUHALER comme traitement anti-inflammatoire de secours et d'entretien.



**1 inhalateur =
médicament D'ENTRETIEN
+ médicament DE SECOURS***

Référence : 1. Monographie de Symbicort® Turbuhaler®. AstraZeneca Canada Inc. 8 février 2021.

* La portée clinique n'a pas été établie.



SYMBICORT®, TURBUHALER® et le logo d'AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.

© 2024 AstraZeneca Canada Inc.

1004 Middlegate Road, bureau 5000, Mississauga (Ontario) L4Y 1M4

CA-5275F

