

A guide to your treatment with IMFINZI®

Pr IMFINZI® durvalumab

IMFINZI® is used to treat adults with a type of bladder cancer called muscle-invasive bladder cancer (MIBC) which is when your bladder cancer has spread into the muscle layer of the bladder but not to other parts of the body. It is given in combination with chemotherapy before your bladder is removed, followed by IMFINZI® alone after surgery.



Getting started with IMFINZI®

A bladder cancer diagnosis can come as a shock, and finding the right information might feel overwhelming at first. Learning about your condition and treatment plan can help you take an active role in navigating your care.

In this brochure, you'll learn about muscle-invasive bladder cancer (MIBC) and how adding IMFINZI® to treatment with chemotherapy and surgery may help treat it.

TABLE OF CONTENTS


About muscle-invasive bladder cancer (MIBC)	4
Treatment with chemotherapy and surgery	6
About IMFINZI®	8
Urinary diversion	12
Resources and support	20
Patient associations	20
Important safety information	22


About muscle-invasive bladder cancer

Muscle-invasive bladder cancer (MIBC) is one of the most common types of bladder cancer.

In MIBC, cancer cells spread into or through the muscle layer of the bladder wall, and are more likely to spread.


Stages of MIBC





Stage 2

The tumour has grown into the muscle layer of the bladder




Stage 3a

The tumour has grown into nearby tissues outside of the bladder (but not into the pelvic or abdominal walls), or into 1 pelvic lymph node

Stage 3b

The tumour has grown into 2 or more pelvic lymph nodes, or to 1 or more of the iliac lymph nodes above the pelvis



Stage 4a

The tumour has grown into the wall of the pelvis or abdomen, or it has spread to lymph nodes farther from the bladder

IMFINZI® is used to treat adults with a type of bladder cancer called muscle-invasive bladder cancer (MIBC) which is when your bladder cancer has spread into the muscle layer of the bladder but not to other parts of the body.

Talk to your doctor to learn more about your stage of MIBC.

Chemotherapy + surgery are options used to treat muscle-invasive bladder cancer



Chemotherapy + Surgery

To treat MIBC, doctors typically recommend a surgery called a radical cystectomy. This means removing the bladder, along with nearby organs and tissues if the cancer has spread. These could include the prostate, uterus, or ovaries.

Meet the care team members involved in your treatment plan

Urologist
A doctor who is an expert in the male urinary system and the reproductive organs.

Urologic oncologist
A doctor who diagnoses cancers of the urinary tract and treats the cancer using surgery and other types of treatment.

Pathologist
A type of doctor who examines body tissues and cells using a microscope to help diagnose illnesses, including cancer.

Medical oncologist
Works with other members of your healthcare team to develop a treatment plan. They may recommend therapies to help treat cancer before and after surgery.

Oncology nurse
Provides hands-on care, like giving medicine, managing your care, answering questions, and helping you cope with side effects.

Wound, Ostomy and Continence (WOC) nurse
A nurse who specializes in wound, ostomy (a surgically-created opening in the body to allow waste to exit the body), and continence (the ability to control movements of the bladder and bowel) care.

Psychologist and psychiatrist
They are mental health experts who help manage issues such as depression, anxiety, or other mental health conditions that affect how you feel.

Nutritionist
Offers guidance on what foods or diets are most suitable for your particular condition.

There may be other healthcare providers beyond this list who could also be involved in your care.

IMFINZI® durvalumab

How is IMFINZI® given?

IMFINZI® is given



as an intravenous infusion



at your doctor's office

or at an infusion centre





for about 60 minutes per infusion

Before surgery:

You'll receive IMFINZI® together with chemotherapy every 3 weeks for 4 cycles.

After surgery:

You'll receive IMFINZI® every 4 weeks for up to 8 cycles.



Missed dose or appointment to get IMFINZI®

It is very important that you keep all your appointments to get IMFINZI®. If you miss an appointment, call your doctor as soon as possible to discuss next steps.



Overdose

If you think you, or a person you are caring for, have been given too much IMFINZI®, contact a healthcare professional, hospital emergency department, regional poison control centre, or Health Canada's toll-free number (1-844-POISON-X / 1-844-764-7669) immediately, even if there are no symptoms.

Questions to ask your doctor

The questions here can help guide your conversation with your doctor as you learn more about MIBC and build your treatment plan together.

- **What is the goal of treatment before and after surgery (perioperative treatment)?**
- **How do therapies like IMFINZI® work?**
- **How will I receive IMFINZI®?**
- **What are the possible side effects of IMFINZI®?**
- **What is a urinary diversion?**
- **What are the pros and cons of each urinary diversion option?**
- **What should I expect during my recovery?**

Understanding your treatment journey with IMFINZI®

It can be helpful to think of treatment with IMFINZI® as a journey in 3 steps. Here's an overview about what to expect:

Pre-surgery
IMFINZI® + chemotherapy

You and your care team will talk about how to prepare for surgery and your urinary diversion options (these are different ways of going to the bathroom). They will also refer you to a medical oncologist.

A medical oncologist will start your treatment with IMFINZI® + chemotherapy as a first step before surgery. You'll receive IMFINZI® together with chemotherapy every 3 weeks for 4 cycles.

Surgery

A urologist/urologic oncologist will perform a cystectomy. This is a procedure that removes part or all of the bladder, and sometimes surrounding organs and tissues if the cancer has spread.

You will continue to receive IMFINZI® after surgery every 4 weeks for up to 8 cycles.

Post-surgery
IMFINZI®

As you recover from surgery and adapt to your urinary diversion, you will continue with IMFINZI®. IMFINZI® will be given every 4 weeks for up to 8 cycles.

Your care team will look after you to see how your body is still responding to treatment.

Types of urinary diversion

After you've had surgery to remove your bladder, you'll need a different way to go to the bathroom. Urine will be rerouted, or "diverted," using one of the methods here. This is called urinary diversion.

There are 3 common types of urinary diversion



Ileal conduit (ostomy)

- Your surgeon will create a small opening in the stomach called a stoma
- You'll pass urine through your stoma into a bag worn on the outside of your body called a urostomy bag
- Your urostomy bags will be designed so that you can conceal them beneath your clothing
- Depending on the type of urostomy bag you have, you will either empty the urine from the bag or replace the bag with a new one, when needed



Neobladder

- Your surgeon will create a new bladder through surgery
- This is done by creating a new pouch to hold urine using a part of the small intestine
- You'll learn to contract your stomach muscles to help pass urine
- It may feel unfamiliar, but with practice, it should get easier



Indiana pouch

- Your surgeon will take a segment of large intestine and a section of the small intestine to make an internal pouch into which the ureters flow
- The short piece of small intestine is brought to the surface of the abdomen (the stoma)
- There is no external pouch and the stoma is very small, and can be covered with a bandage

The tips below may help as you adapt after surgery:

If you have a urostomy bag:

- Ask for support from a stoma nurse if you have any problems with your bag. They can provide ongoing guidance and education as you recover

- Try emptying your neobladder more often (every 1–3 hours) at the beginning of your recovery to help reduce leaks
- Accidents may happen as you adjust. It can be helpful to set a schedule to empty your neobladder every 3–4 hours until you know the signs that it's full
- If you experience bladder control issues (incontinence) or other challenges, it can help to connect with your healthcare team. They can offer you more personalized guidance

- You will need to use a catheter inserted into the stoma several times per day to empty the pouch. Your healthcare team will provide thorough training on this process

Talk to your healthcare team about the pros and cons of each option before deciding on a urinary diversion.



Support for the treatment journey

Use the next section to familiarize yourself with tips for infusion days, advice for lifestyle changes after surgery, and resources to support you.

How do I prepare for my treatment with IMFINZI® infusions?

A little planning can go a long way to help improve your treatment experience.
Here are a few suggestions to help get you ready.

On infusion days, remember to:



Dress comfortably in loose-fitting clothes



Take any necessary identification and insurance cards



Show up early so you don't feel rushed



Eat a small meal before your infusion



Bring a list of medications you are currently taking



Keep yourself occupied with reading materials, puzzles, and/or mobile devices



Write down any questions you may have for your care team



Drink plenty of water to stay hydrated



Schedule your next infusion before you leave

Notes

Use the space below to write down any additional questions you may have, or to jot down notes during your appointment.

What to expect after surgery

There are some important steps you'll take after surgery to get the most out of your treatment plan for MIBC.

Continuing your treatment journey after surgery

After surgery, you'll recover in the hospital for as long as it is necessary for you, where your care team will look after you. As part of your continued treatment plan, you'll keep treating MIBC with IMFINZI®.

Starting another treatment after surgery may feel overwhelming. But it's an important step in your treatment plan.

In addition to your treatment team, other care specialists can help as you recover from surgery.

Lean on your care team for support after surgery

Remember, it's normal to have challenges as you get used to your neobladder, urostomy bag, or Indiana pouch. With time, you'll build more confidence in managing daily life with a urinary diversion.

If you have questions or have difficulties with your recovery, your care team is there to help.



IMFINZI® durvalumab

Finding support



Every person living with bladder cancer has their own unique challenges and needs for different kinds of support.

The organizations listed here are great places to find practical resources, offering information and assistance to help you navigate your treatment journey. Remember that there may be local groups in your area, and you can ask your care team about these. Finding community can help you keep moving forward.

Canadian Cancer Society

The Canadian Cancer Society is a national, non-profit, community-based organization. It provides information on cancer prevention, detection, and treatment for all types of cancer, offers programs and services for people living with cancer, and funds cancer research.

cancer.ca

Bladder Cancer Canada

Bladder Cancer Canada is the first and only patient advocacy organization in Canada dedicated to bladder cancer issues. It provides support to patients, caregivers, and families from diagnosis through treatment and beyond.

bladdercancercanada.org

Ostomy Canada Society

The Ostomy Canada Society is a non-profit volunteer organization dedicated to all people with an ostomy, and their families.

ostomycanada.ca

AstraZeneca Canada Inc. does not operate and is not responsible for the content on these third-party apps. If you have any questions or concerns about the products, services, or content on these third-party apps, please contact the third parties directly.

Important safety information about IMFINZI®

Serious warnings and precautions

IMFINZI® can cause serious side effects which can lead to death. These serious side effects may include:

- inflammation of the intestines (enterocolitis) that can cause tears or holes (perforation) in the intestines
- inflammation of the liver (hepatitis) that can lead to liver failure
- inflammation of the skin that can lead to severe skin reaction (Stevens-Johnson syndrome)
- inflammation of hormone glands that may affect how these glands work
- inflammation of the lung tissue (pneumonitis or interstitial lung disease)
- inflammation of the heart muscle (myocarditis)
- inflammation of the brain (encephalitis)
- neuromuscular disease that leads to skeletal muscle weakness (myasthenia gravis)

Possible side effects of IMFINZI®

These are not all the possible side effects you may have when taking IMFINZI®. If you experience any side effects not listed here, tell your healthcare professional.

Very common side effects (≥10%):

- low number of red blood cells (anemia)
- low number of white blood cells (neutropenia, lymphopenia or leukopenia)
- low number of blood platelets (thrombocytopenia)
- peripheral nerve damage
- abnormal kidney function tests (blood creatinine increased)
- nausea
- hair loss
- decreased appetite
- feeling tired or weak
- dizziness
- constipation
- vomiting
- cough
- diarrhea
- stomach or abdominal pain
- skin rash or itchiness
- fever
- swelling of the legs
- upper respiratory tract infection
- abnormal liver tests (aspartate aminotransferase increased; alanine aminotransferase increased)
- underactive thyroid gland that can cause tiredness or weight gain
- abnormal pancreas test
- inflammation of the nerves causing numbness, weakness, tingling or burning pain of the arms and legs (neuropathy peripheral)

If you would like to report an adverse event, you can contact us at **https://www.astrazeneca.ca/en/astrazeneca-in-canada/contact-us.html**.

For any product inquiries or adverse event reporting, it can also be done:
By phone: 1-800-668-6000 (English) / 1-800-461-3787 (French)
By email: **medinfo.Canada@astrazeneca.com** Online: **contactazmedical.astrazeneca.com**

NOTE: Contact your healthcare professional if you need information about how to manage your side effects. The Canada Vigilance Program does not provide medical advice.

Please refer to the Patient Medication Information Brochure for complete safety information.

IMFINZI® durvalumab



AstraZeneca

IMFINZI® and the AstraZeneca logo are registered trademarks of AstraZeneca AB, used under license by AstraZeneca Canada Inc.
© 2025 AstraZeneca Canada Inc.
All rights reserved. CA-11345E

MEMBER OF INNOVATIVE MEDICINES CANADA

REVIEWED BY PAAB

Pr IMFINZI®
durvalumab



Guide pour votre traitement par **IMFINZI®**

Pr IMFINZI®
durvalumab

IMFINZI® est utilisé pour traiter les adultes atteints d'un type de cancer de la vessie appelé cancer de la vessie avec envahissement musculaire (CVEM), lorsque votre cancer s'est propagé dans la couche musculaire de la vessie, mais pas à d'autres parties du corps. Vous recevrez IMFINZI® avec une chimiothérapie avant le retrait de votre vessie, puis IMFINZI® seul après la chirurgie.



Guide de démarrage du traitement par IMFINZI®

Un diagnostic d'un cancer de la vessie est souvent bouleversant, et trouver la bonne information peut d'abord sembler difficile. Si vous apprenez à connaître votre maladie et votre plan de traitement, vous pourrez jouer un rôle actif dans votre traitement.

Dans cette brochure, vous apprendrez à connaître le cancer de la vessie avec envahissement musculaire (CVEM) et comment l'ajout d'IMFINZI® à la chimiothérapie et à l'intervention chirurgicale peut aider le traitement.

TABLE DES MATIÈRES


À propos du cancer de la vessie avec envahissement musculaire (CVEM)	4
La chimiothérapie et la chirurgie	6
À propos d'IMFINZI®	8
Dérivation urinaire	12
Ressources et soutien	20
Associations de patients	20
Renseignements importants sur l'innocuité	22

À propos du cancer de la vessie avec envahissement musculaire

Le cancer de la vessie avec envahissement musculaire (CVEM) est l'un des types de cancer de la vessie les plus fréquents.

Dans le CVEM, les cellules cancéreuses se propagent dans ou à travers la couche de muscle de la paroi de la vessie et sont plus susceptibles de migrer.


Stades du CVEM





Stade 2

La tumeur a envahi la couche musculaire de la vessie




Stade 3a

La tumeur s'est propagée aux tissus voisins à l'extérieur de la vessie (mais pas dans la paroi pelvienne ou abdominale) ou dans 1 ganglion lymphatique pelvien

Stade 3b

La tumeur s'est propagée dans au moins 2 ganglions lymphatiques pelviens ou dans au moins 1 des ganglions lymphatiques iliaques au-dessus du bassin



Stade 4a

La tumeur s'est propagée dans la paroi du bassin ou de l'abdomen, ou vers d'autres parties du corps, comme les ganglions lymphatiques loin de la vessie

IMFINZI® est utilisé pour traiter les adultes atteints d'un type de cancer de la vessie appelé cancer de la vessie avec envahissement musculaire (CVEM), lorsque votre cancer s'est propagé dans la couche musculaire de la vessie, mais pas à d'autres parties du corps.

Consultez votre médecin pour en savoir davantage sur le stade de votre CVEM.

La chimiothérapie et la chirurgie sont des options pour traiter le cancer de la vessie avec envahissement musculaire.



Chimiothérapie + **Chirurgie**

Pour traiter le CVEM, les médecins recommandent habituellement une intervention chirurgicale appelée cystectomie radicale. Cette opération consiste à enlever la vessie, ainsi que les organes et les tissus avoisinants qui ont été envahis par le cancer. Cela peut comprendre la prostate, l'utérus ou les ovaires.

Voici les membres de l'équipe soignante qui pourraient participer à votre plan de traitement

Urologue
Médecin spécialiste du système urinaire et des organes reproducteurs masculins.

Uro-oncologue
Médecin qui diagnostique les cancers des voies urinaires et traite le cancer par la chirurgie et d'autres types de traitements.

Pathologiste
Médecin qui examine les tissus et les cellules du corps au microscope afin de faciliter le diagnostic de maladies, comme le cancer.

Oncologue médical
Médecin qui collabore avec les autres membres de votre équipe soignante pour concevoir un plan de traitement. Il peut recommander des traitements contre le cancer avant et après l'intervention chirurgicale.

Infirmière en oncologie
Infirmières qui prodiguent les soins directs, par exemple en vous administrant les médicaments, en prenant en charge vos soins, en répondant à vos questions et en vous aidant à atténuer les effets secondaires.

Infirmière stomothérapeute
Infirmière spécialisée dans le soin des plaies, des stomies (ouverture pratiquée chirurgicalement pour permettre l'expulsion des selles ou de l'urine) et de la continence (capacité de maîtriser l'excrétion des selles et de l'urine).

Psychologue et psychiatre
Experts en santé mentale qui traitent des problèmes comme la dépression, l'anxiété ou d'autres troubles mentaux qui influent sur ce que vous ressentez.

Nutritionniste
Professionnel qui vous guide dans le choix des aliments ou du régime qui conviennent le mieux à votre situation.

D'autres professionnels de la santé ne figurant pas dans cette liste peuvent participer à vos soins.

IMFINZI® durvalumab

Comment IMFINZI® est-il administré?

IMFINZI est administré



par perfusion intraveineuse



au cabinet de votre médecin

ou dans un centre de perfusion





Une perfusion dure environ 60 minutes

Avant l'intervention chirurgicale :

Vous recevrez IMFINZI® et une chimiothérapie toutes les 3 semaines pendant 4 cycles.

Après l'intervention chirurgicale :

Vous recevrez IMFINZI® toutes les 4 semaines pour un maximum de 8 cycles.



Dose oubliée ou rendez-vous manqué pour recevoir IMFINZI®

Il est très important de vous présenter à tous les rendez-vous pour recevoir IMFINZI®. Si vous manquez un rendez-vous, appelez votre médecin dès que possible pour discuter des prochaines étapes.



Surdose

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris ou reçu une trop grande quantité d'IMFINZI®, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, ou composez le numéro sans frais de Santé Canada, 1-844 POISON-X (1-844-764-7669), même en l'absence de signes ou de symptômes.

Questions à poser à votre médecin

Voici des questions qui peuvent orienter votre conversation avec votre médecin à mesure que vous apprenez à connaître le CVEM et que vous concevez votre plan de traitement ensemble.

- **Quel est l'objectif du traitement avant et après l'intervention chirurgicale (traitement péri-opératoire)?**
- **Comment les traitements comme IMFINZI® agissent-ils?**
- **Comment vais-je recevoir IMFINZI®?**
- **Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à IMFINZI®?**
- **Qu'est-ce qu'une dérivation urinaire?**
- **Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de dérivation urinaire?**
- **À quoi devrais-je m'attendre pendant mon rétablissement?**

Comprendre votre parcours thérapeutique avec IMFINZI®

Cela pourrait aider de considérer le traitement par IMFINZI® comme un parcours en 3 étapes. Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Avant l'intervention chirurgicale
IMFINZI® + chimiothérapie

Vous et votre équipe soignante discuterez de la façon de vous préparer à l'intervention chirurgicale et des options en ce qui concerne la dérivation urinaire (différentes façons possibles d'évacuer l'urine). De plus, votre équipe vous orientera vers un oncologue médical.

Un oncologue médical commencera votre traitement par IMFINZI® + chimiothérapie comme première étape avant l'intervention chirurgicale. Vous recevrez IMFINZI® et une chimiothérapie toutes les 3 semaines durant 4 cycles.

Intervention chirurgicale

Un urologue/uro-oncologue procédera à une cystectomie. Cette intervention consiste à enlever une partie ou la totalité de la vessie et, parfois, des organes et des tissus environnants si le cancer s'y est propagé.

Après l'intervention chirurgicale, vous continuerez de recevoir IMFINZI® toutes les 4 semaines pour un maximum de 8 cycles.

Après l'intervention chirurgicale
IMFINZI®

Pendant que vous vous rétablirez de l'intervention chirurgicale et que vous vous adapterez à votre dérivation urinaire, vous poursuivrez votre traitement par IMFINZI®. Celui-ci vous sera administré toutes les 4 semaines pour un maximum de 8 cycles.

Votre équipe soignante vous suivra pour voir comment votre corps répond au traitement.

IMFINZI® durvalumab

Types de dérivation urinaire

Une fois votre vessie enlevée, votre façon d'uriner changera. L'urine sera détournée, ou « dérivée », de l'une des façons suivantes. C'est ce qu'on appelle la dérivation urinaire.

Il existe 3 types courants de dérivation urinaire



Conduit iléal (stomie)

- Le chirurgien pratiquera une petite ouverture dans le ventre, appelée stomie.
- Votre urine s'écoulera par la stomie dans un sac porté à l'extérieur du corps, appelé sac d'urostomie.
- Vos sacs d'urostomie seront conçus pour ne pas paraître sous vos vêtements.
- Selon le type de sac d'urostomie que vous aurez, vous viderez l'urine du sac ou vous devrez changer le sac pour un nouveau au besoin.



Néovessie

- Le chirurgien créera une nouvelle vessie pendant l'intervention chirurgicale.
- Cela consiste à créer une nouvelle poche pour contenir l'urine au moyen d'une petite partie de l'intestin grêle.
- Vous apprendrez à contracter les muscles de votre ventre pour évacuer l'urine.
- Cela peut sembler inhabituel, mais ce sera plus facile avec la pratique.



Poche d'Indiana

- Votre chirurgien utilisera un segment du gros intestin et une section de l'intestin grêle pour fabriquer une poche interne dans laquelle les uretères déboucheront.
- La courte section de l'intestin grêle relie la poche à la surface de l'abdomen (stomie).
- Il n'y a pas de poche externe et la stomie est très petite, de sorte qu'elle peut être couverte par un bandage.

Voici quelques conseils qui pourraient faciliter votre adaptation après l'intervention :

Si vous avez un sac d'urostomie :

- Demandez l'aide d'une infirmière stomothérapeute si vous éprouvez des problèmes avec votre sac. Elle peut vous guider et vous informer durant votre rétablissement.

- Essayez de vider votre néovessie plus souvent (toutes les 1 à 3 heures) au début de votre rétablissement pour réduire les fuites.
- Des accidents sont possibles pendant votre adaptation. Il peut être utile d'établir un horaire pour vider votre néovessie toutes les 3 à 4 heures jusqu'à ce que vous reconnaissiez les signes qu'elle est pleine.
- Si vous avez du mal à maîtriser votre néovessie (incontinence) ou éprouvez d'autres problèmes, vous pouvez consulter votre équipe soignante. Elle pourrait vous offrir des conseils plus personnalisés.

- Vous devrez insérer un cathéter dans la stomie plusieurs fois par jour pour vider la poche. Votre équipe soignante vous montrera en détail comment faire.

Parlez avec votre équipe soignante des avantages et des inconvénients de chacune des options avant de décider du type de dérivation urinaire.



Soutien durant le parcours thérapeutique

Lisez la prochaine section pour prendre connaissance des conseils relatifs aux jours de perfusion et aux changements des habitudes de vie après l'intervention chirurgicale, ainsi que des ressources pour vous aider.

Comment dois-je me préparer pour le traitement par perfusion d'IMFINZI®?

Un peu de planification peut grandement améliorer votre expérience pendant le traitement. Voici quelques suggestions pour vous aider à vous préparer.

Les jours de perfusion, n'oubliez pas ce qui suit :



Portez des vêtements confortables amples.



Apportez les pièces d'identité nécessaires et vos cartes d'assurance.



Présentez-vous tôt pour ne pas vous sentir pressé.



Prenez un repas léger avant la perfusion.



Apportez la liste des médicaments que vous prenez actuellement.



Pensez à vous occuper avec de la lecture, un casse-tête et/ou un appareil portable.



Notez les questions que vous pourriez avoir pour votre équipe soignante.



Buvez beaucoup d'eau pour demeurer hydraté.



Planifiez votre rendez-vous pour la prochaine perfusion avant de quitter le centre.

Notes

Dans l'espace ci-dessous, écrivez toute autre question que vous pourriez avoir ou prenez des notes pendant votre rendez-vous.

À quoi vous attendre après l'intervention chirurgicale

Vous devrez suivre d'importantes étapes après votre intervention chirurgicale pour soutirer le maximum de votre plan de traitement contre le CVEM.

Poursuivre votre parcours thérapeutique après l'intervention

Après l'intervention chirurgicale, vous resterez à l'hôpital aussi longtemps qu'il le faudra, où votre équipe soignante s'occupera de vous. Dans le cadre de votre plan de traitement en cours, vous continuerez de recevoir le traitement par IMFINZI® pour le CVEM.

Il peut être décourageant de commencer un nouveau traitement après l'intervention chirurgicale, mais cette étape est importante dans votre plan de traitement.

En plus de votre équipe soignante, d'autres spécialistes des soins pourront vous aider durant votre rétablissement de l'intervention.

Appuyez-vous sur votre équipe soignante pour obtenir du soutien après l'intervention chirurgicale

Souvenez-vous qu'il est normal d'éprouver de la difficulté pendant votre adaptation à votre néovessie, à votre sac d'urostomie ou à votre poche d'Indiana. Avec le temps, vous apprendrez à gérer votre quotidien avec une dérivation urinaire.

Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes pendant votre rétablissement, votre équipe soignante est là pour vous.



IMFINZI® durvalumab

Trouver du soutien



Chaque personne vivant avec un cancer de la vessie rencontre ses propres difficultés et éprouve ses propres besoins pour différents types de soutien.

Les organismes cités ci-dessous sont d'excellents endroits où trouver des ressources utiles, offrant de l'information et de l'assistance pour vous aider à traverser votre parcours thérapeutique. Souvenez-vous qu'il peut exister des groupes locaux dans votre région et que vous pouvez vous en informer auprès de votre équipe soignante. L'adhésion à une communauté peut vous aider à progresser.

Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer est un organisme national sans but lucratif à caractère communautaire. Elle donne de l'information sur la prévention, la détection et le traitement de tous les types de cancer, offre des programmes et des services aux personnes vivant avec le cancer et finance la recherche sur le cancer.

cancer.ca/fr

Cancer de la vessie Canada

Cancer de la vessie Canada est le premier et le seul organisme canadien de défense des droits des patients qui se consacre aux questions liées au cancer de la vessie. Il fournit aux patients, à leurs soignants et à leurs familles le soutien dont ils ont besoin au moment du diagnostic, durant tout le traitement et au-delà.

bladdercancercanada.org/fr/

Société canadienne des personnes stomisées

La Société canadienne des personnes stomisées est un organisme sans but lucratif formé de bénévoles qui se consacre à assister les personnes vivant avec une stomie ainsi que leurs familles.

www.ostomycanada.ca/

AstraZeneca Canada Inc. ne gère pas ces applications tierces et n'assume pas la responsabilité de leurs contenus. Si vous avez des questions ou des préoccupations sur les produits, services ou contenus de ces applications tierces, veuillez communiquer directement avec les organisations tierces respectives.

Renseignements importants sur l'innocuité d'IMFINZI®

Mises en garde et précautions importantes

IMFINZI® peut causer des effets secondaires graves pouvant entraîner la mort. Ces effets secondaires graves peuvent être les suivants :

- inflammation de l'intestin (entérocolite) pouvant entraîner des déchirures ou des trous (perforations) dans l'intestin;
- inflammation du foie (hépatite) pouvant entraîner une insuffisance hépatique;
- inflammation de la peau pouvant entraîner une réaction cutanée grave (syndrome de Stevens-Johnson);
- inflammation des glandes hormonales pouvant avoir un effet sur leur fonctionnement;
- inflammation du tissu pulmonaire (pneumonite ou pneumopathie interstitielle);
- inflammation du muscle du cœur (myocardite);
- inflammation du cerveau (encéphalite);
- maladie neuromusculaire entraînant une faiblesse des muscles du squelette (myasthénie grave).

Effets secondaires pouvant être associés à IMFINZI®

Lorsque vous recevez IMFINZI®, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Effets secondaires très courants (≥ 10 %) :

- Faible nombre de globules rouges (anémie)
- Faible nombre de globules blancs (neutropénie, lymphopénie ou leucopénie)
- Faible nombre de plaquettes (thrombocytopénie)
- Lésions aux nerfs périphériques
- Résultats anormaux aux analyses évaluant le fonctionnement des reins (hausse du taux sanguin de créatinine)
- Nausées
- Perte de cheveux/poils
- Diminution de l'appétit
- Sensation de fatigue ou de faiblesse
- Étourdissements
- Constipation
- Vomissements
- Toux
- Diarrhée
- Douleur abdominale ou à l'estomac
- Éruptions cutanées ou démangeaisons
- Fièvre
- Enflure des jambes
- Infection des voies respiratoires supérieures
- Valeurs anormales aux examens permettant d'évaluer le fonctionnement du foie (hausse du taux d'aspartate aminotransférase; hausse du taux d'alanine aminotransférase)
- Hypoactivité de la glande thyroïde pouvant causer de la fatigue ou un gain de poids
- Valeurs anormales aux examens permettant d'évaluer le fonctionnement du pancréas
- Inflammation des nerfs provoquant des engourdissements, une faiblesse, des picotements ou une sensation douloureuse de brûlure dans les bras et les jambes (neuropathie périphérique)

Pour déclarer une manifestation indésirable, communiquez avec nous à l'adresse suivante **https://www.astrazeneca.ca/fr/astrazeneca-in-canada/contact-us.html**.

Pour toute demande concernant un produit ou pour déclarer une manifestation indésirable, vous pouvez aussi communiquer avec nous :
par téléphone : 1-800-668-6000 (anglais) / 1-800-461-3787 (français)
par courriel : **medinfo.Canada@astrazeneca.com** en ligne : **https://contactazmedical.astrazeneca.com**

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Veuillez consulter la brochure d'information sur le médicament destinée aux patients pour obtenir de l'information complète sur l'innocuité du médicament.

IMFINZI® durvalumab



AstraZeneca

IMFINZI® et le logo d'AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.
© 2025 AstraZeneca Canada Inc.
Tous droits réservés. CA-11345F

MEMBRE DE MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

RÉVISÉ PAR CCPP

Pr IMFINZI® durvalumab