



Guide du traitement par TRUQAP[®]



Cette brochure peut vous aider à comprendre votre traitement.

Votre médecin vous a prescrit TRUQAP, et vous avez peut-être des questions au sujet de ce traitement.

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer un traitement par TRUQAP. Cette notice est un résumé et elle ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit.

Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur TRUQAP sont disponibles.

Table des matières

Apprenez à connaître TRUQAP

Qu'est-ce que TRUQAP?	4
Analyse des biomarqueurs	4
Comment TRUQAP agit-il?	5

Précautions à prendre en ce qui concerne TRUQAP

Mises en garde et précautions importantes au sujet du traitement par TRUQAP	6-7
---	-----

Posologie et administration

Dose habituelle	8-9
Comment utiliser TRUQAP?	10
Dose oubliée	11
Surdose	11

Effets secondaires du traitement par TRUQAP

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à TRUQAP?	12-13
Effets secondaires graves potentiels liés à l'utilisation de TRUQAP et mesures à prendre	14-15
Prise en charge d'effets secondaires particuliers	16-19
Autres mises en garde à connaître	20-21
Surveiller vos effets secondaires	22-23

Liens utiles	24-26
--------------------	-------



Apprenez à connaître TRUQAP

Qu'est-ce que TRUQAP?

TRUQAP est un médicament d'ordonnance utilisé en association avec un autre médicament appelé fulvestrant.

Il est utilisé chez les femmes adultes pour traiter un cancer du sein de stade avancé ou s'étant propagé à d'autres parties du corps, et qui a progressé pendant ou après une endocrinothérapie.

Le cancer du sein doit être à récepteurs hormonaux positifs (RH+) et HER2 négatif (HER2-), et présenter un gène *PIK3CA*, *AKT1* et/ou *PTEN* anormal.

Analyse des biomarqueurs


TRUQAP est indiqué pour les personnes atteintes d'un cancer du sein avancé ou métastatique RH+/HER2- et dont les analyses attestent de la présence d'un gène *PIK3CA*, *AKT1* et/ou *PTEN* anormal.

Votre professionnel de la santé vérifiera si votre tumeur est porteuse d'un ou plusieurs de ces gènes anormaux afin de s'assurer que TRUQAP vous convient.

Les gènes anormaux peuvent également être appelés biomarqueurs, mutations ou altérations.


Comment TRUQAP agit-il?

Les protéines appelées kinases AKT aident les cellules cancéreuses à croître et à se multiplier.



TRUQAP agit en bloquant les effets des protéines appelées kinases AKT.

En bloquant leur action, TRUQAP peut réduire la croissance et la propagation du cancer et aider à détruire les cellules cancéreuses.



Légende

● Kinase AKT

► TRUQAP

TRUQAP + fulvestrant

L'association de TRUQAP et du fulvestrant entraîne une plus grande activité antitumorale.

Précautions à prendre en ce qui concerne TRUQAP

Mises en garde et précautions importantes au sujet du traitement par TRUQAP

TRUQAP peut causer ce qui suit :



- Réactions cutanées graves, y compris :
 - **Syndrome d'hypersensibilité avec éosinophilie et symptômes généralisés (syndrome DRESS)**, une réaction cutanée grave pouvant avoir des répercussions sur un ou plusieurs organes;
 - **Érythème polymorphe**, une réaction allergique de la peau; et
 - **Érythrodysesthésie palmo-plantaire**, une réaction cutanée touchant la paume des mains et la plante des pieds.



- **Hyperglycémie** (taux élevé de sucre dans le sang), y compris l'**acidocétose diabétique** (une complication du diabète, où votre organisme produit une quantité accrue d'acides dans le sang).



- **Diarrhée grave** pouvant entraîner une déshydratation et une lésion rénale aiguë (lorsque vos reins cessent soudainement de fonctionner correctement).

N'utilisez pas TRUQAP dans les cas suivants :

- ▶ Si vous êtes allergique au capivasertib ou à l'un des autres ingrédients de TRUQAP.

TRUQAP contient les ingrédients suivants :

- ▶ **Ingrédient médicinal:** capivasertib;
- ▶ **Ingrédients non médicinaux:** hydrogénophosphate de calcium, copovidone, croscarmellose sodique, hypromellose, oxyde de fer noir (E172), oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer jaune (E172), macrogol 3350, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, polydextrose, eau purifiée, dioxyde de titane, triglycérides (à chaîne moyenne).




Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser TRUQAP, afin d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment :

- ▶ Si vous avez ou avez déjà eu le diabète ou des taux élevés de sucre dans votre sang. TRUQAP n'a pas fait l'objet d'études chez les patients qui utilisent l'insuline pour traiter le diabète.
- ▶ Si vous présentez les facteurs de risque d'hyperglycémie suivants :

▪ antécédents familiaux de diabète	▪ déshydratation ou diarrhée, transpiration ou vomissements excessifs
▪ infection en cours	▪ malnutrition
▪ prise de stéroïdes ou d'autres médicaments de chimiothérapie	▪ obésité
- ▶ Si vous avez de la diarrhée ou des selles molles.
- ▶ Si vous avez des antécédents d'éruptions cutanées ou d'autres problèmes de peau.
- ▶ Si vous avez des problèmes rénaux ou des taux élevés de créatinine ou d'acide urique dans votre sang.
- ▶ Si vous avez des problèmes de foie.

Posologie et administration



 **Dose du matin**
Prendre 2 comprimés
de 200 mg

 **Dose du soir**
Prendre 2 comprimés
de 200 mg

Dose habituelle


Dose recommandée de TRUQAP (en association avec le fulvestrant):

Adultes : 400 mg (2 comprimés TRUQAP de 200 mg) deux fois par jour pendant 4 jours, suivis de 3 jours sans traitement.

Cela correspond à une dose quotidienne totale de 800 mg.
Se reporter au schéma posologique.

Votre professionnel de la santé prescrira TRUQAP en association avec un médicament injectable appelé fulvestrant. Il vous indiquera comment il est administré.

Schéma posologique de TRUQAP à chaque semaine



- ▶ Si vous présentez des effets secondaires, votre professionnel de la santé devra peut-être modifier votre dose de TRUQAP, interrompre temporairement votre traitement ou encore l'arrêter définitivement.
- ▶ NE modifiez PAS votre dose ou n'arrêtez pas de prendre TRUQAP sauf si votre professionnel de la santé vous indique de le faire.



Discutez avec votre professionnel de la santé de la date à laquelle vous devez commencer votre traitement par TRUQAP.

Posologie et administration

Comment utiliser TRUQAP?



Prenez TRUQAP exactement comme votre professionnel de la santé vous l'a indiqué.



Prenez TRUQAP 2 fois par jour (à environ 12 heures d'intervalle), à peu près aux mêmes heures chaque jour.



Prenez TRUQAP avec ou sans aliments.



Avalez les comprimés TRUQAP entiers avec de l'eau. Il ne faut pas mâcher, écraser ou diviser les comprimés.



Il ne faut pas prendre de comprimés cassés, fissurés ou qui semblent endommagés.



Le pamplemousse peut interagir avec TRUQAP. Vous ne devez pas boire ou manger des produits à base de pamplemousse pendant un traitement par TRUQAP.



Votre professionnel de la santé prescrira TRUQAP en association avec un médicament injectable appelé fulvestrant. Il vous indiquera comment il est administré.

La dose habituelle de fulvestrant utilisée avec TRUQAP est de 500 mg (2 injections) administrés les jours 1 et 15 du premier cycle de 28 jours, puis le jour 1 de chaque cycle de 28 jours suivant.



Si vous n'êtes pas ménopausée :

- Votre professionnel de la santé vous prescrira également un médicament appelé agoniste de l'hormone de libération de la lutéinostimuline (LHRH) durant votre traitement par TRUQAP.

Dose oubliée



Si vous avez oublié de prendre une dose de TRUQAP :

- Vous pouvez la prendre dans les 4 heures qui suivent l'heure à laquelle vous la prenez habituellement.

S'il s'est écoulé plus de 4 heures depuis l'heure prévue pour votre dose :

- Sautez la dose oubliée.
- Prenez la dose suivante à l'heure habituelle.
- NE prenez PAS 2 doses pour compenser celle que vous avez oublié de prendre. Reportez-vous au schéma posologique ci-dessus.



Ne doublez pas la dose

- Si vous vomissez après avoir pris une dose de TRUQAP, ne prenez pas de dose de remplacement. Prenez la dose suivante selon l'horaire habituel.

Surdose

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris ou reçu une trop grande quantité de TRUQAP, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Effets secondaires du traitement par TRUQAP

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à TRUQAP?

Lorsque vous prenez ou recevez TRUQAP, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous.



Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.



- Diarrhée



- Nausées



- Vomissements



- Maux d'estomac, troubles digestifs (dyspepsie)



- Éruption cutanée, rougeur de la peau, formation d'ampoules sur les lèvres, autour des yeux ou dans la bouche, peau qui pèle, inflammation de la peau et peau sèche, démangeaisons (prurit)



- Douleur, rougeur et enflure de la muqueuse dans différentes parties du corps, p. ex. la muqueuse génitale (inflammation des muqueuses)



- Bouche sèche



- Plaies dans la bouche ou ulcères avec inflammation des gencives (stomatite)



- Mauvais goût dans la bouche (dysgueusie)



- Fatigue



- Mal de tête



- Fièvre



- Perte de poids

Effets secondaires graves potentiels liés à l'utilisation de TRUQAP et mesures à prendre



Si jamais vous éprouvez un ou plusieurs de ces symptômes ou effets secondaires, informez-en votre professionnel de la santé.

Très fréquent



Diarrhée : Nombre plus élevé de selles, selles liquides, douleurs et/ou crampes à l'estomac.



Autres troubles gastro-intestinaux (s'ils sont graves) : Nausées, vomissements, maux de ventre, diminution de l'appétit, brûlures d'estomac, ballonnements ou troubles digestifs.



Hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le sang) : Augmentation de la soif, besoin fréquent d'uriner, plus grande quantité d'urine, augmentation de l'appétit avec perte de poids, bouche sèche, confusion, nausées, vomissements, haleine fruitée, peau sèche ou rouge.



Réactions cutanées : Rougeur de la peau associée à une desquamation/peau qui pèle ou une éruption cutanée.



Stomatite (plaies dans la bouche, rougeur et enflure de la muqueuse de la bouche) ou **inflammation d'autres muqueuses** : Ulcère ou lésion, plaques rouges et enflammées sur les lèvres ou à l'intérieur de la bouche ou du nez; inflammation de la muqueuse de l'œil ou du vagin.

Fréquent



Infection des voies urinaires (infection dans le système urinaire, y compris les reins, les uretères, la vessie et l'urètre): Douleur ou sensation de brûlure en urinant, sang dans l'urine ou urine trouble, urine nauséabonde.



Hypokaliémie (faible taux de potassium dans le sang): Faiblesse et spasmes musculaires, battements cardiaques irréguliers

Peu fréquent



Érythrodysesthésie palmo-plantaire (aussi appelée syndrome mains-pieds): Rougeur et/ou enflure, desquamation de la paume des mains et de la plante des pieds, sensation de picotements et sensation de brûlure aux pieds.



Acidocétose diabétique (une complication grave liée au taux élevé de sucre dans le sang): Nausées, vomissements, douleurs abdominales, difficulté à respirer, haleine fruitée, confusion, fatigue inhabituelle ou somnolence.

Si vous éprouvez un ou plusieurs des symptômes ou effets secondaires énumérés ci-dessous, cessez de prendre ou de recevoir TRUQAP et obtenez immédiatement des soins médicaux.

- ▶ **Dermatite exfoliative généralisée** (une réaction cutanée survenant lorsque de grandes zones de la peau s'écaillent ou pèlent): Desquamation et/ou formation d'écailles à la surface de la peau.
- ▶ **Lésion rénale aiguë** (perte de la fonction rénale): Rétention d'urine, enflure des jambes ou autour des yeux, sensation de fatigue, essoufflement, confusion, nausées.
- ▶ **Éruption cutanée appelée érythème polymorphe**: Plaques rouges ou pourpres surélevées sur la peau, présence possible d'une ampoule ou d'une croûte dans le centre, possiblement accompagnées de lèvres enflées, de légères démangeaisons ou de sensation de brûlure.
- ▶ **Syndrome d'hypersensibilité avec éosinophilie et symptômes généralisés (syndrome DRESS)** (une réaction cutanée grave pouvant avoir des répercussions sur un ou plusieurs organes): Fièvre, éruption cutanée grave, ganglions lymphatiques enflés, symptômes pseudogrippaux, enflure du visage; possiblement avec un jaunissement de la peau ou des yeux, essoufflement, toux sèche, douleur ou malaise à la poitrine, soif, envie d'uriner moins souvent, urine moins abondante.

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire inconfortable qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Prise en charge d'effets secondaires particuliers

Vous pouvez ressentir des effets secondaires en tout temps pendant votre traitement par TRUQAP en association avec le fulvestrant.

Il est important de discuter des effets secondaires avec votre professionnel de la santé. Celui-ci peut vous donner des conseils.

Voici quelques renseignements concernant certains des effets secondaires possibles.

Sélection d'effets secondaires courants	Mesures de soutien	Conseils de prise en charge
 Diarrhée	▪ Suivez un régime à faible teneur en fibres (p. ex. bananes, riz, compote de pommes, rôties nature, craquelins, œufs, poisson et volaille). ▪ Évitez les déclencheurs comme la caféine et l'alcool, les aliments riches en fibres, les produits laitiers et les aliments épicés ou acides.	▪ Communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé et prenez vos médicaments prescrits selon l'ordonnance. ▪ Votre équipe soignante pourrait vous recommander de prendre des médicaments pour aider à arrêter ou ralentir votre diarrhée. ▪ Buvez suffisamment de liquides chaque jour pour rester hydraté : – Il peut s'agir de liquides non gazeux, sans caféine et clairs comme de l'eau, une solution de réhydratation orale ou du bouillon. ▪ Modifiez votre régime et vos habitudes alimentaires (p. ex. prenez de plus petits repas, plus souvent).

Sélection d'effets secondaires courants	Mesures de soutien	Conseils de prise en charge
 Nausées	▪ Au lieu de prendre 3 gros repas, mangez de petites quantités tout au long de la journée. ▪ Évitez les odeurs fortes. ▪ Demandez à quelqu'un d'autre de préparer et de faire cuire vos aliments.	▪ Communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé si vous présentez des nausées graves. ▪ Suivez votre traitement selon les directives de votre équipe soignante. ▪ Buvez des boissons fraîches ou à température ambiante. ▪ Mangez des aliments qui ont aidé par le passé.
 Réactions cutanées	▪ Si votre professionnel de la santé vous a prescrit des émollients, gardez-les à portée de main. ▪ Utilisez des savons doux. ▪ Prenez un bain à l'eau froide ou tiède. ▪ Évitez les lotions et les crèmes contenant de l'alcool, du parfum ou des colorants. ▪ Évitez de vous exposer au soleil. – Si vous allez à l'extérieur, utilisez un écran solaire à large spectre qui contient de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane.	▪ Communiquez avec votre professionnel de la santé en cas de changements à votre peau comme des éruptions cutanées, des rougeurs, des démangeaisons, de la sécheresse, de la peau qui s'écaille ou qui pèle sur le visage, le corps, les mains et les pieds. ▪ Votre équipe soignante pourrait vous recommander les traitements suivants : émollients, corticostéroïdes topiques, corticostéroïdes à action générale ou antihistaminiques oraux non sédatifs. Parlez à votre professionnel de la santé pour en savoir plus.

Prise en charge d'effets secondaires particuliers

Sélection d'effets secondaires courants	Mesures de soutien	Conseils de prise en charge
 Hyper-glycémie	▪ Mangez à des heures régulières et ne sautez pas de repas. ▪ Optez pour des aliments faibles en calories, en gras saturés, en sucre et en sel. ▪ Faites un suivi de vos aliments, boissons et activités physiques. ▪ Buvez de l'eau plutôt que du jus ou des boissons gazeuses. ▪ Limitez les boissons alcoolisées. ▪ Contrôlez vos portions d'aliments. ▪ Effectuez tous les tests demandés par votre équipe soignante en temps opportun. - Si les résultats des tests sanguins sont anormaux, vous pourriez avoir besoin d'un traitement pour corriger ces effets secondaires. - Veillez à respecter les conditions de jeûne pour obtenir des résultats précis.	▪ Communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé si vous présentez des symptômes d'hyperglycémie, notamment : - Augmentation de la soif - Besoin plus fréquent d'uriner ou plus grande quantité d'urine - Augmentation de l'appétit - Perte de poids - Fatigue - Bouche sèche - Confusion - Nausées/vomissements - Haleine fruitée - Rougeur ou sécheresse de la peau

Sélection d'effets secondaires courants	Mesures de soutien	Conseils de prise en charge
 Fatigue	▪ Adoptez de saines habitudes de sommeil. ▪ Mangez sainement. – Parlez à un nutritionniste de votre régime alimentaire. ▪ Prévoyez du temps pour vous détendre. ▪ Limitez le stress. ▪ Réduisez votre consommation de caféine. ▪ Faites le suivi de votre fatigue en notant les moments de la journée où vous avez le plus d'énergie ou les éléments pouvant contribuer à votre fatigue.	▪ Demandez de l'aide pour les courses et les tâches. ▪ Essayez de rester actif en faisant des exercices légers comme la marche, le yoga et le tai-chi.
 Stomatite (Les symptômes peuvent inclure des plaies dans la bouche [ulcères], des rougeurs et une enflure de la muqueuse de la bouche, de la douleur, des saignements et des difficultés à manger ou à boire.)	▪ Vérifiez votre bouche, vos gencives et votre langue chaque jour pour détecter tout signe de plaies et informez votre équipe soignante immédiatement de tout changement. ▪ Suivez votre plan de soins bucco-dentaires selon les recommandations: – Rincez votre brosse à dents à l'eau chaude pour aider à l'assouplir avant de vous brosser les dents. – Utilisez une brosse à dents à poils très souples. – Nettoyez vos dents et votre bouche dans les 30 minutes suivant un repas. – Rincez votre brosse à dents à l'eau chaude après usage et gardez-la dans un endroit propre et sec.	▪ Communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé. ▪ Suivez votre plan de soins bucco-dentaires mis à jour par votre équipe soignante. ▪ Maintenez une bonne alimentation.

Autres mises en garde à connaître :

TRUQAP peut causer des effets secondaires graves, y compris :



- **Diarrhée grave.** Votre professionnel de la santé surveillera votre état de santé. Il pourrait vous donner des médicaments pour prendre en charge la diarrhée et vous recommander de boire plus de liquides pendant le traitement par TRUQAP pour éviter de vous déshydrater.



- **Hyperglycémie grave** (taux élevé de sucre dans le sang). Parlez **sans tarder** à votre professionnel de la santé si vous présentez l'un des signes de taux accru de sucre suivants : soif excessive, bouche sèche, besoin d'uriner plus fréquent ou quantité d'urine plus importante que d'habitude, confusion, nausées, vomissements, haleine fruitée, peau sèche ou rouge et augmentation de l'appétit associée à une perte de poids. Votre professionnel de la santé devra peut-être vous prescrire des médicaments pour ramener votre taux de sucre à la normale. Si vous présentez des facteurs de risque d'hyperglycémie, vous devriez discuter des changements à votre mode de vie avec votre professionnel de la santé pour vous aider à prendre en charge votre taux de sucre dans le sang (glycémie). Certains patients prenant TRUQAP ont présenté une acidocétose diabétique (une complication grave liée à des taux élevés de sucre dans le sang) moins de 10 jours après le début du traitement. Dans certains cas, l'acidocétose diabétique a été fatale.



Examens et tests

Vous aurez des visites régulières avec votre professionnel de la santé durant votre traitement par TRUQAP. Il surveillera votre glycémie en effectuant les tests suivants :

- Glycémie à jeun (taux de sucre dans le sang après une période d'au moins 8 heures sans avoir consommé de nourriture).
 - Cette mesure sera effectuée avant le traitement par TRUQAP, et régulièrement pendant celui-ci.
- Taux d'hémoglobine glyquée (un marqueur du taux de sucre dans le sang au cours des 8 à 12 dernières semaines).
 - Cette mesure sera effectuée avant le traitement et environ tous les 3 mois pendant le traitement.

Si vous avez des antécédents de diabète ou si vous êtes

plus à risque de présenter une glycémie élevée, on pourrait vérifier votre taux de sucre plus souvent.



Grossesse et contraception

- Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir durant un traitement par TRUQAP, il y a des mises en garde importantes dont vous devez discuter avec votre professionnel de la santé.
- Vous NE devez PAS tomber enceinte durant un traitement par TRUQAP. Cela pourrait être nocif pour le bébé à naître.
- Si vous êtes une femme apte à devenir enceinte, vous devez utiliser une méthode de contraception efficace durant le traitement et pendant au moins 4 semaines après la prise de la dernière dose de TRUQAP.
- Si vous devenez enceinte durant un traitement par TRUQAP, parlez sans tarder à votre professionnel de la santé.



Allaitement

- Vous NE devez PAS allaiter durant un traitement par TRUQAP. On ignore si TRUQAP passe dans le lait maternel.
- Consultez votre professionnel de la santé pour connaître la meilleure façon de nourrir votre bébé durant un traitement par TRUQAP.



Enfants et adolescents (âgés de moins de 18 ans)

On ne doit pas administrer TRUQAP aux enfants et aux adolescents âgés de moins de 18 ans.



Adultes de 65 ans ou plus

Vous pourriez présenter un risque accru d'effets secondaires graves si vous avez 65 ans ou plus.



Conduite de véhicules et utilisation de machines

TRUQAP peut causer de la fatigue. Avant de conduire ou d'effectuer des tâches pouvant nécessiter une attention particulière, attendez de savoir comment vous réagissez à TRUQAP.



Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Remarque : Les jours où vous devez prendre votre médicament sont indiqués sur fond bleu.

														
Exemples	Diarhée	Nausées	Vomissements	Maux d'estomac, flatulences, éructifs	Augmentation des gaz, sensation de plénitude, ballonnements	Constipation, douleurs et efforts de défécation, hémorroïdes, pertes de sang	Goutte, neuropathie périphérique du corps	Goutte, neuropathie périphérique du corps	Plaies dues aux brûlures, plaies avec des ulcères, plaies avec des infections, plaies avec des germes (panaris)	Bouche sèche	Fatigue	Maux de tête	Plaies	Notes (y compris autres effets secondaires potentiels)
JOUR1 (continuer)														
JOUR2														
JOUR3														
JOUR4														
JOUR5														
JOUR6														
JOUR7														
JOUR8														

22

Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment :

	Si vous avez ou avez déjà eu le diabète ou des taux élevés de sucre dans votre sang. TRUQAP n'a pas fait l'objet d'études chez les patients qui utilisent l'insuline pour traiter le diabète. Si vous présentez les facteurs de risque d'hyperglycémie suivants : • antécédents familiaux de diabète • infection en cours • prise de stéroïdes ou d'autres médicaments de chimiothérapie • déshydratation ou diarrhée, transpiration ou vomissements excessifs • malnutrition • obésité
	Si vous avez de la diarrhée ou des selles molles.
	Si vous avez des antécédents d'éruptions cutanées ou d'autres problèmes de peau.
	Si vous avez des problèmes rénaux ou des taux élevés de créatinine ou d'acide urique dans votre sang.
	Si vous avez des problèmes de foie.



Communiquez avec votre professionnel de la santé si vous remarquez un changement dans votre état de santé général pendant votre traitement par TRUQAP.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :



- ▶ en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- ▶ en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.



- ▶ Vous pouvez aussi signaler un effet secondaire soupçonné à votre professionnel de la santé ou en numérisant ce code QR.

Liens utiles

Pour accéder à ces ressources, veuillez numériser les codes QR ci-dessous.



Réseau canadien du cancer du sein



Rethink Breast Cancer (en anglais seulement)



Société canadienne du cancer



Fondation cancer du sein du Québec

Des questions?

Le programme de soutien aux patients (PSP) en oncologie d'AstraZeneca est à votre disposition pour répondre à vos questions au sujet de TRUQAP et de nos services de soutien.



1-877-280-6208

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HE
(y compris les jours fériés fédéraux)

Durant les week-ends, les jours fériés et les jours fériés de l'Ontario, la ligne téléphonique du PSP prendra les messages vocaux et on retournera les appels le jour ouvrable suivant.



enrollment@azoncologypsp.ca

Pour de plus amples renseignements sur TRUQAP:



- ▶ Adressez-vous à votre professionnel de la santé



- ▶ Numérisez pour accéder à la notice Renseignements destinés aux patient-e-s sur TRUQAP



- ▶ Numérisez le code pour accéder aux ressources et au matériel de soutien en visitant **TRUQAP.ca**

Remarque: Vous aurez besoin du DIN de TRUQAP pour accéder au site Web.

TRUQAP® et le logo AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.

© AstraZeneca Canada Inc. 2026
CA-10377F

