

AMORCER LE TRAITEMENT PAR SAPHNELO^{MC}



QUESTIONS QUE VOUS VOUDREZ PEUT-ÊTRE POSER À VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

Pour en savoir davantage sur le produit, veuillez consulter la section sur les renseignements destinés aux patients de la monographie de produit à l'adresse <https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/frenchassets/Ourmedicines/SAPHNELO-product-monograph-fr.pdf>. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre médecin.



SAPHNELO est un médicament d'ordonnance utilisé en appoint au traitement de référence du lupus chez les adultes atteints du lupus érythémateux disséminé (LED) évolutif avec expression d'auto-anticorps, dont la maladie n'est pas bien maîtrisée par d'autres traitements de référence (corticostéroïdes oraux et/ou immunosuppresseurs et/ou antipaludiques).

VOICI DES QUESTIONS QUE VOUS VOUDREZ PEUT-ÊTRE POSER À VOTRE MÉDECIN



MODE D'ACTION DE SAPHNELO

- Comment SAPHNELO agit-il?



EFFETS POTENTIELS DE SAPHNELO SUR MOI

- Quels sont les bienfaits que SAPHNELO pourrait m'apporter?
- Y aura-t-il des changements dans mon plan thérapeutique?

Pour en savoir davantage sur le produit, veuillez consulter la section sur les renseignements destinés aux patients de la monographie de produit à l'adresse <https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/frenchassets/Ourmedicines/SAPHNELO-product-monograph-fr.pdf>. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre médecin.



ADMINISTRATION DE SAPHNELO

- Qu'est-ce qu'une perfusion?
- Combien de temps dure l'administration de SAPHNELO?
- À quelle fréquence devrai-je recevoir SAPHNELO?



POINTS À CONSIDÉRER CONCERNANT L'INNOCUITÉ DE SAPHNELO

- Quels sont les effets secondaires possibles de SAPHNELO?
- Quels sont les effets secondaires les plus fréquents?



INTÉGRATION DE SAPHNELO DANS MON PLAN THÉRAPEUTIQUE

- Pendant combien de temps dois-je prendre SAPHNELO?
- À quel moment puis-je cesser de prendre SAPHNELO?
- Devrai-je continuer à prendre mes autres médicaments?

Pour en savoir davantage sur le produit, veuillez consulter la section sur les renseignements destinés aux patients de la monographie de produit à l'adresse <https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/frenchassets/Ourmedicines/SAPHNELO-product-monograph-fr.pdf>. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre médecin.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ

- **N'utilisez pas SAPHNELO dans les cas suivants:** Si vous êtes allergique à l'anifrolumab ou à l'un des autres ingrédients de SAPHNELO. En cas de doute, consultez votre professionnel de la santé avant de recevoir SAPHNELO.
- **Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ou de recevoir SAPHNELO ou pendant la prise de ce médicament, afin d'aider à éviter les effets secondaires et d'assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment:**
 - Si vous pensez avoir déjà fait une réaction allergique à ce médicament.
 - Si vous avez une infection ou des symptômes d'infection.
 - Si vous avez une infection de longue durée (chronique) ou une infection qui ne cesse de revenir.
 - Si vous avez eu ou avez un cancer.
 - Si vous avez récemment reçu ou si vous prévoyez recevoir un vaccin (immunisation). Certains types de vaccins ne doivent pas vous être administrés pendant votre traitement par SAPHNELO.
 - Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous prévoyez le devenir pendant le traitement par SAPHNELO. On ignore si SAPHNELO peut être nocif pour votre bébé à naître. Votre professionnel de la santé décidera si vous pouvez recevoir SAPHNELO ou si vous devez cesser le traitement par SAPHNELO.
 - Si vous allaitez. On ignore si SAPHNELO passe dans le lait maternel. Votre professionnel de la santé vous indiquera si vous devez cesser le traitement par SAPHNELO pendant que vous allaitez ou si vous devez cesser d'allaiter.
- **Vous pourriez être plus à risque de contracter une infection lorsque vous êtes traité par SAPHNELO, y compris une infection des voies respiratoires et le zona.**
- **Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris: médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine douce.**
- **Certains types de vaccins pourraient interagir avec SAPHNELO.**
- **Effets secondaires qui pourraient être associés à SAPHNELO (lorsque vous prenez SAPHNELO, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous; si c'est le cas, parlez-en à votre professionnel de la santé):**
 - Les effets secondaires fréquents survenus durant les études sur SAPHNELO comprennent les douleurs articulaires et les douleurs aux bras ou aux jambes.
 - Les effets secondaires peu fréquents sont les douleurs au cou, la faiblesse et la fatigue.
 - SAPHNELO peut provoquer une réaction à la perfusion ou une réaction allergique (hypersensibilité).

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ

(suite)

- **Avissez votre professionnel de la santé immédiatement ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche si vous présentez l'un des symptômes d'une réaction allergique grave (anaphylaxie) suivants :** enflure du visage, de la langue ou de la bouche et/ou difficultés respiratoires, évanouissement, étourdissements, sensation de tête légère (en raison d'une chute de la tension artérielle).

QU'EST-CE QUE SAPHNELO?

SAPHNELO est un médicament d'ordonnance utilisé en appoint au traitement de référence du lupus chez les adultes atteints du lupus érythémateux disséminé (LED) évolutif avec expression d'auto-anticorps, dont la maladie n'est pas bien maîtrisée par d'autres traitements de référence (corticostéroïdes oraux et/ou immunosuppresseurs et/ou antipaludiques).

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des façons suivantes :

- en communiquant avec le programme Connexion360^{MC} au 1-833-814-0258 ou à l'adresse support@connect360sle.ca;
- en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Pour en savoir davantage sur le produit, veuillez consulter la section sur les renseignements destinés aux patients de la monographie de produit à l'adresse <https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/frenchassets/Ourmedicines/SAPHNELO-product-monograph-fr.pdf>. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre médecin.



NOTES

Après avoir discuté avec votre professionnel de la santé, vous pouvez continuer à recevoir du soutien par l'intermédiaire du programme Connexion360^{MC} :

- en téléphonant au 1-833-814-0258
OU
- en écrivant à l'adresse support@connect360sle.ca

Référence :

1. Monographie de SAPHNELO. AstraZeneca Canada Inc. 30 novembre 2021.

Le programme Connexion360^{MC} a été créé et est financé par AstraZeneca, exclusivement pour les patients qui se sont vu prescrire SAPHNELO par leur médecin. Ce programme ne vise pas à remplacer le plan thérapeutique établi par votre médecin. Les services offerts peuvent varier selon les régions. Si vos besoins changent, vous pouvez choisir des services qui vous conviennent mieux ou vous retirer du programme. SAPHNELO^{MC}, Connexion360^{MC} et le logo d'AstraZeneca sont des marques de commerce d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.
© 2024 AstraZeneca Canada Inc. CA-5435F



MEMBRE DE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA



AstraZeneca