

SE PRÉPARER À LA PERFUSION



SAPHNELO^{MC} est un médicament d'ordonnance utilisé en appoint au traitement de référence du lupus chez les adultes atteints du lupus érythémateux disséminé (LED) évolutif avec expression d'auto-anticorps, dont la maladie n'est pas bien maîtrisée par d'autres traitements de référence (corticostéroïdes oraux et/ou immunosuppresseurs et/ou antipaludiques).

BIEN QUE CHAQUE EXPÉRIENCE DE PERFUSION SOIT UNIQUE, LES CONSEILS SUIVANTS PEUVENT VOUS AIDER À VOUS Y PRÉPARER.

Pour en savoir davantage sur le produit, veuillez consulter la section sur les renseignements destinés aux patients de la monographie de produit à l'adresse <https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/frenchassets/Ourmedicines/SAPHNELO-product-monograph-fr.pdf>. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre médecin.

AVANT VOTRE PERFUSION...

Veillez lire la lettre de bienvenue et consulter votre médecin.

Appelez votre centre de perfusion ou le bureau d'un professionnel de la santé pour obtenir des renseignements sur le lieu de votre perfusion.

Dressez une liste des médicaments à apporter avec vous lors de votre perfusion.

- Il est possible qu'on vous interroge sur vos antécédents médicaux lors de votre visite.

Planifiez comment vous allez vous rendre à votre rendez-vous.

Prévoyez arriver d'avance.

- La dose complète de SAPHNELO s'administre sur une période d'environ 30 minutes. Votre centre de perfusion peut vous demander d'arriver plus tôt pour vous préparer.



Pour en savoir davantage sur le produit, veuillez consulter la section sur les renseignements destinés aux patients de la monographie de produit à l'adresse <https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/frénchassets/Ourmedicines/SAPHNELO-product-monograph-fr.pdf>. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre médecin.

PENDANT VOTRE PERFUSION...

Prévoyez un passe-temps.

- Vérifiez quelles commodités sont offertes à votre centre de perfusion.
- Si cela est permis, pensez à apporter votre livre préféré, un magazine, de la musique ou même un ordinateur portable.

Recevez votre dose.

- Un membre de votre équipe soignante vous administrera SAPHNELO par perfusion intraveineuse (i.v.), c.-à-d. à l'aide d'une aiguille habituellement insérée dans une veine de votre bras.
- L'équipe de votre centre de perfusion fera un suivi en vérifiant votre pression artérielle et d'autres signes vitaux.
- SAPHNELO peut provoquer une réaction à la perfusion ou une réaction allergique (hypersensibilité). Les effets secondaires fréquents survenus durant les études sur SAPHNELO comprennent les douleurs articulaires et les douleurs aux bras ou aux jambes. Les effets secondaires peu fréquents sont les douleurs au cou, la faiblesse et la fatigue. Cette liste d'effets secondaires pouvant être associés à SAPHNELO n'est pas exhaustive. Pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires, consultez votre médecin.

Consultez votre équipe soignante si vous avez la moindre question pendant l'administration de SAPHNELO.



Pour en savoir davantage sur le produit, veuillez consulter la section sur les renseignements destinés aux patients de la monographie de produit à l'adresse <https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/frenchassets/Ourmedicines/SAPHNELO-product-monograph-fr.pdf>. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre médecin.

3



APRÈS VOTRE PERFUSION...

Planifiez votre prochain rendez-vous de perfusion avant de partir, si cela est possible.

- SAPHNELO est habituellement administré une fois toutes les 4 semaines.

Établissez une routine.

- Maintenant que vous avez reçu votre première perfusion, pensez à la façon dont vous allez vous préparer la prochaine fois.

Félicitez-vous!

Pour en savoir davantage sur le produit, veuillez consulter la section sur les renseignements destinés aux patients de la monographie de produit à l'adresse <https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/frenchassets/Ourmedicines/SAPHNELO-product-monograph-fr.pdf>. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre médecin.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ

- **N'utilisez pas SAPHNELO dans les cas suivants:** Si vous êtes allergique à l'anifrolumab ou à l'un des autres ingrédients de SAPHNELO. En cas de doute, consultez votre professionnel de la santé avant de recevoir SAPHNELO.
- **Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ou de recevoir SAPHNELO ou pendant la prise de ce médicament, afin d'aider à éviter les effets secondaires et d'assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment:**
 - si vous pensez avoir déjà fait une réaction allergique à ce médicament.
 - si vous avez une infection ou des symptômes d'infection.
 - si vous avez une infection de longue durée (chronique) ou une infection qui ne cesse de revenir.
 - si vous avez eu ou avez un cancer.
 - si vous avez récemment reçu ou si vous prévoyez recevoir un vaccin (immunisation). Certains types de vaccins ne doivent pas vous être administrés pendant votre traitement par SAPHNELO.
 - si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous prévoyez le devenir pendant le traitement par SAPHNELO. On ignore si SAPHNELO peut être nocif pour votre bébé à naître. Votre professionnel de la santé décidera si vous pouvez recevoir SAPHNELO ou si vous devez cesser le traitement par SAPHNELO.
 - si vous allaitez. On ignore si SAPHNELO passe dans le lait maternel. Votre professionnel de la santé vous indiquera si vous devez cesser le traitement par SAPHNELO pendant que vous allaitez ou si vous devez cesser d'allaiter.
- **Vous pourriez être plus à risque de contracter une infection lorsque vous êtes traité par SAPHNELO, y compris une infection des voies respiratoires et le zona.**
- **Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris: médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine douce.**
- **Certains types de vaccins pourraient interagir avec SAPHNELO.**
- **Effets secondaires qui pourraient être associés à SAPHNELO** (lorsque vous prenez SAPHNELO, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous; si c'est le cas, parlez-en à votre professionnel de la santé):
 - Les effets secondaires fréquents survenus durant les études sur SAPHNELO comprennent les douleurs articulaires et les douleurs aux bras ou aux jambes.
 - Les effets secondaires peu fréquents sont les douleurs au cou, la faiblesse et la fatigue.
 - SAPHNELO peut provoquer une réaction à la perfusion ou une réaction allergique (hypersensibilité).
- **Avisez votre professionnel de la santé immédiatement ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche si vous présentez l'un des symptômes d'une réaction allergique grave (anaphylaxie) suivants:** enflure du visage, de la langue ou de la bouche et/ou difficultés respiratoires, évanouissement, étourdissements, sensation de tête légère (en raison d'une chute de la tension artérielle).

Pour en savoir davantage sur le produit, veuillez consulter la section sur les renseignements destinés aux patients de la monographie de produit à l'adresse <https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/frenchassets/Ourmedicines/SAPHNELO-product-monograph-fr.pdf>. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre médecin.

QU'EST-CE QUE SAPHNELO ?

SAPHNELO est un médicament d'ordonnance utilisé en appoint au traitement de référence du lupus chez les adultes atteints du lupus érythémateux disséminé (LED) évolutif avec expression d'auto-anticorps, dont la maladie n'est pas bien maîtrisée par d'autres traitements de référence (corticostéroïdes oraux et/ou immunosuppresseurs et/ou antipaludiques).

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des façons suivantes :

- En communiquant avec le programme Connexion360^{MC} au 1-833-814-0258 ou à l'adresse support@connect360sle.ca;
- En consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- En composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Pour en savoir davantage sur le produit, veuillez consulter la section sur les renseignements destinés aux patients de la monographie de produit à l'adresse <https://www.astrazeneca.ca/content/dam/az-ca/frenchassets/Ourmedicines/SAPHNELO-product-monograph-fr.pdf>. Ces renseignements ne remplacent pas une discussion avec votre médecin.

Après avoir discuté avec votre professionnel de la santé, vous pouvez continuer à recevoir du soutien par l'intermédiaire du programme Connexion360^{MC} :

- en téléphonant au 1-833-814-0258,
OU
- en écrivant à l'adresse support@connect360sle.ca

Référence :

1. Monographie de SAPHNELO. AstraZeneca Canada Inc., 30 novembre 2021.

Le programme Connexion360^{MC} a été créé et est financé par AstraZeneca exclusivement pour les patients qui se sont vu prescrire SAPHNELO par leur médecin. Ce programme ne vise pas à remplacer le plan thérapeutique établi par votre médecin. Les services offerts peuvent varier selon les régions. Si vos besoins changent, vous pouvez choisir des services qui vous conviennent mieux ou vous retirer du programme.

SAPHNELO^{MC}, Connexion360^{MC} et le logo d'AstraZeneca sont des marques de commerce d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.

©2024 AstraZeneca Canada Inc. CA-5432F